









Mamepiann

CHRARGOD ENAMBLE RELEASED

MTOOKEL ARCOTH

antenna noacuteon

The state of the s

GRANIER AND THE PARTY

CAHKTHETEPSTPE

4481

Mamepianu

КЪ БЛИЖАЙШЕМУ ПОЗНАНІЮ

ПРОЗЯБАЕМОСТИ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.

КНИЖКА ПЕРВАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1844.

Издание Императорской Академии Наукъ



zur

Pflanzenkunde

des

Russischen Reiches.

Erste Lieferung.

St. Petersburg, 1844.

Druck und Verag der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

ARNOLD ALLORETUM

ОТДЪЛЬНАЯ ФЛОРА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНІИ

или

POCHUCE

ЗАМЪЧЕННЫХЪ ВЪ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ РАСТЕНІЙ.

COCTABJEHHAЯ

K. A. Menepomb.

FLORULA PROVINCIAE TAMBOV

oder

Verzeichniss

der, im Gouvernement Tambow beobachteten Pflanzen.

Von

C. A. Meger.

THE THOUSE IS A SHOT OF THE SHOELD WELL WHEN THE SHOULD WELL

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Извъстно сколь недостаточно было доселъ наше познаніе употребительныхъ въ разныхъ областяхъ Россійской Имперій въ народъ названій растеній. Въ слъдствіе запроса Министерства Государственныхъ Имуществъ, Императорская Академія Наукъ изъявила свою готовность способствовать къ ближайшему изследованію сихъ общепринятыхъ въ народъ названій растеній, коль скоро Министерство окажеть съ своей стороны Академіи содъйствіе къ собранію нужныхъ на сей конецъ матеріаловъ. Въ следъ за симъ Министерство Государственныхъ Имуществъ предписало подвъдомственнымъ ему лъснымъ чиновникамъ собирать и сушить дико растущія въ ихъ округахъ прозябенія, съ означеніемъ народныхъ ихъ наименованій и употребле нія делаемаго изъ нихъ престолюдиномъ, и доставлять таковыя коллекціи Министерству. Съ тёхъ поръ Академія получила изъ третьяго Департамента Государственныхъ Имуществъ болъе ста подобныхъ собраній изъ разныхъ областей Имперіи отъ Волги до Балтійскаго моря и отъ Тавриды до Архангельска. Хотя собранія сій не вст одинаковаго достоинства, однакожъ

Vorwort.

Es ist bekannt, wie wenig genügend bis jetzt unsere Kenntniss der, in den verschiedenen Provinzen des Russischen Reiches, bei dem Volke gebräuchlichen Pflanzennamen ist. In Folge einer Anfrage des Ministeriums der Reichsdomänen, erklärte die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften ihre Bereitwilligkeit, zu der nähern Erforschung dieser, bei dem Volke üblichen Pflanzennamen mitzuwirken, sobald jenes Ministerium der Akademie zu der Erlangung der, zu einem solchen Unternehmen nöthigen Materialien behülflich sein wolle. Das Ministerium der Reichsdomänen hatte daher den, diesem Ministerium untergebenen Forstbeamten vorgeschrieben, die in ihrem Bezirke wildwachsenden Pflanzen zu sammeln. zu trocknen, und mit den Volksnamen zu bezeichnen, zugleich den Gebrauch, welchen das Landvolk von diesen Pflanzen macht, anzugeben und diese Sammlungen dem Ministerium einzusenden. Seitdem hat die Akademie, aus dem dritten Departement der Reichsdomänen, über hundert solcher Sammlungen, aus den verschiedensten Provinzen des Reichs, von der Wolga bis zum Baltischen Meere, und von Taurien bis Archangel empfanмногія изъ нихъ представляють довольно годный матеріаль къ ближайшему познанію Флоры Россійской Имперіи, и заслуживають быть обнародованными А посему Академія предположила издавать въ свѣтъ обильнѣйшія изъ сихъ коллекцій, пользуясь къ дополненію ихъ и другими источниками, въ видѣ отдѣльныхъ вебольшихъ провинціальныхъ флоръ, которыя хотя сами по себѣ болѣе или менѣе не полны, однакоже не преминутъ принести пользу Ботаникамъ и составятъ собою ялро къ позднѣйшимъ обширнѣйшимъ трудамъ сего рода

Мы представляемъ здѣсь на первый разъ отдѣльную флору Тамбовской губерніи. Эта губернія простпрается отъ 51° 15′ далеко на сѣверъ до 55° 10′, и отъ 56° 15 до 61° восточной долготы. Въ южной части своей она имѣетъ степную флору, которая, по словамъ Палласа, отъ Хопра, болѣе и болѣе скудѣя протягивается почти до Цны Отсюдаже далѣе къ сѣверу постепенно умножаются лѣса и пахотныя поля, вовсе вытѣсняя собою степную флору.

Единственныя мит доселт извъстныя свъдънія о ликорастущих прозябеніях сей губерніи сообщають намъ во 1) Палласово путешествіе, Pallas Reise Bd. III S. 686—688. Палласъ замътилъ тамъ 16 породъ изъ южной части губерніи; во 2) Диссертація Вейнманна о собранныхъ Тёрмеромъ около Тамбова растеніяхъ. Ихъ, за исключеніемъ разностей, 147 породъ, коихъ gen. Obgleich nun diese Sammlungen nicht alle von gleichem Werthe sind, so enthalten doch viele derselben ein recht gutes Material zu einer nähern Kenntniss der Flora des Russischen Reiches, die wol verdienen veröffentlicht zu werden. Diese reichhaltigeren Sammlungen sollen daher, mit gleichzeitiger Benutzung anderer Quellen, in Gestalt kleiner Provincial-Florulen publicirt werden, die, obgleich mehr oder weniger unvollständig, doch gewiss nicht ohne Werth für die Botaniker sein und den Kern zu spätern, vollständigeren Arbeiten dieser Art bilden werden.

Wir geben hier zuerst eine Florula des Gouvernements Tambow. Dieses Gouvernement zieht sich von 51°15′ weit nach Norden, bis 55°10′ hin, und erstreckt sich von 56°15′ bis 61° östlicher Länge. Im südlichen Theile hat es theilweise eine Steppenflor, die, nach Pallas, vom Choper an immer ärmlicher werdend, sich fast bis zum Zna hinzieht. Von hier werden, je weiter nach Norden, die Waldungen und Ackerfelder immer häufiger, die die Steppenflor ganz verdrängen.

Die einzigen mir bekannten Notizen über die wildwachsenden Pflanzen dieses Gouvernements sind 1) Pallas Reise, Bd. III S. 686 — 688. Pallas führt hier 16 Arten aus dem südlichen Theile des Gouvernements an.
2) Eine Abhandlung von Weinmann über die von Thörmer um Tambow gesammelten Pflanzen. Es sind, mit Ausschluss der Varietäten, 147 Arten, von denen

1141) не встръчаются въ изследованныхъ мною породахъ. Третьимъ источникомъ къ составленію предлежащій росписи были шесть коллекцій сушеныхъ растеній изъ лъсныхъ обруговъ Елатомска и Темникова, а слъдовательно съ съвера, Моршанска и Спаска, изъ средней части, и Липецка и Узмана, съ юга губерніи 2). Эти коллекцій заключають въ себъ 190 видовь, изъ которыхъ 157 педостаетъ у Вениманна, и такъ всего 304, а съ присовокупленіемъ и указанныхъ Палласомъ растеній, въ этой росписи 312 породъ. Это количество конечно не значительно и едва ли составляетъ 2/, всъхъ дъйствительно водящихся въ этой губерніи явнобрачныхъ, и посему роспись сія отнюдь не можетъ дълать притязаній на полноту; но она все же будетъ достаточна, чтобы дать намъ довольно върную картину прозябаемости этого края.

Тамбовская губернія къ югу достигаетъ шпроты Курской, а къ съверу Московской губерній; сличеніе растительности сихъ трехъ губерній было бы весьма занимательно. А посему я вездъ обращалъ вниманіе на Марціуса Prodromus Florae Mosquensis и на Гефта Саtalogue des plantes du district de Dmitrieff. Изъ сра-

¹⁾ Породы сіп въ моей росписи обозначены знакомъ *.

²⁾ Я обозначаль сін области въ росписи моей литерами J, M, L, S, T, U. При тъхъ же растеніяхъ, которыя свойственны тремъ областямъ, ничего не отмъчено.

sich 1141) in den, von mir untersuchten Sammlungen nicht vorfinden. Die dritte Quelle zu dem vorliegenden Verzeichnisse bilden sechs Sammlungen getrockneter Pflanzen aus den Forstbezirken von Jelatomsk und Temnikow, also aus dem Norden, von Morschansk und Spassk, dem mittlern Theile, und von Lipetzk und Usman, dem Süden des Gouvernements²). Diese Sammlungen enthalten 190 Arten, von denen 157 bei Weinmann fehlen. Es sind also überhaupt 304, und wenn wir die von Pallas angegebenen Pflanzen gleichfalls hinzufügen, 312 Arten in diesem Verzeichnisse aufgeführt. Diese Anzahl ist allerdings eine nicht bedeutende, und sie mag wohl kaum 2/s aller, in diesem Gouvernement wirklich wildwachsender Phanerogamen betragen, daher denn auch dieses Verzeichniss durchaus nicht auf Vollständigkeit Anspruch machen kann; es reicht indessen doch immerhin aus, um uns ein ziemlich richtiges Bild der Vegetation dieses Gouvernements zu geben.

Das Gouvernement Tambow erreicht nach Süden die Breite des Gouvernements Kursk, nach Norden die des Gouvernements Moskwa; eine Vergleichung der Vegetation dieser drei Gouvernements möchte nicht ohne Interesse sein. Ich habe daher überall auf Martius Prodromus Florae Mosquensis und auf Höfft's Catalogue des

¹⁾ Diese Arten sind in meinem Verzeichnisse mit einem * bezeichnet

²⁾ Ich habe in meinem Verzeichnisse diese Regionen durch ein J, M, L, S, T, U, bezeichnet; bei den Pflanzen aber, die in drei Regionen wachsen, habe ich gar nichts bemerkt.

вненія этихъ двухъ сочиненій съ моею росписью оказывается, что изъ числа 290 явнобрачныхъ этой росписи (девять новыхъ породъ мною не приняты въ расчетъ), 183 водятся во всъхъ трехъ губерніяхъ, 39 породъ показаны только у Гефта, 20 только у Марціуса, а 48 породъ недостаетъ въ объихъ росписяхъ, хотя онъ въроятно также попадаются и въ тъхъ губерніяхъ.

Почти вст породы водятся и въ Германіи, и у Коха въ его Prodromus, кромт новыхъ, недостаетъ только слъдующихъ видовъ: Scilla sibirica, Iris furcata, Salvia nutans, Senecio anthoraefolius, umbrosus, Linosyris villosa, Artemisia procera, inodora, Rumia leiogona, Spiraea crenata, Lathyrus pisiformis, Arenaria longifolia, Lychnis chalcedonica и Sisymbrium junceum, которыя слъдовательно могутъ почесться представителями восточной флоры.

Что относится до Русскихъ названій растеній, то я должень замѣтить, что многія изъ нихъ конечно уже давно извѣстны; но встрѣчаются также имена, ни гдѣ мною не найденныя. Возможно, что между этими новыми именами вкралось и нѣсколько ошибочныхъ. Нѣкоторыя явно ложныя названія мною вовсе исключены. Еще слѣдуетъ замѣтить объ одномъ неудобствв, а именно, что поселяне не всегда бываютъ точны въ различеніи именъ и часто одному и тому же растенію придаютъ разные имена, и напротивъ того разнымъ растеніямъ одинаковое названіе. Такъ на-

plantes du district de Dmitrieff Rücksicht genommen. Aus der Vergleichung dieser beiden Werke mit meinem Verzeichnisse ergiebt sich, dass von 290 Phanerogamen (die neun neuen Arten habe ich nicht mit in Rechnung gebracht) dieses Verzeichnisses, 183 in allen drei Gouvernements wachsen, 39 andere Arten werden nur von Höfft, 20 blos von Martius angeführt und 48 Arten fehlen in beiden Verzeichnissen, werden aber gewiss fast sämmtlich auch in jenen Gouvernements wachsen.

Fast sämmtliche Arten kommen auch in Deutschland vor, und es fehlen in Koch's Prodromus, ausser den neuen, nur folgende Arten: Scilla sibirica, Iris furcata, Salvia nutans, Senecio anthoraefolius, umbrosus, Linosyris villosa, Artemisia procera, inodora, Rumiu leiogona, Spiraea crenata, Lathyrus pisiformis, Arenaria longifolia, Lychnis chalcedonica und Sisymbrium junceum, die also als die Repräsentanten einer östlichern Flora gelten können.

Was die russischen Pflanzennamen anbetrifft, so muss ich bemerken, dass viele derselben allerdings schon längst bekannt sind; doch sind auch Namen dabei, die ich nirgends verzeichnet gefunden habe. Es ist möglich, dass sich unter diesen neuen Namen einige Irrthümer eingeschlichen haben. Einige entschieden falsche Benennungen habe ich gleich ausgeschlossen. Ein Uebelstand ist es, dass die Landleute nicht immer genau unterscheiden und oft derselben Pflanze verschiedene Namen, verschiedenen Pflanzen dagegen denselben Namen beilegen. So

примъръ всъ Filices слывутъ у нихъ напоротниками, всъ Equiseta хвощемъ, хвощовикомъ, всъ Carices осокою, а если опи имъютъ очень острую былину, острецомъ; здъсь Polygonum lapathifolium слыветъ подъ именемъ лягушника, обыкновенно же такъ называютъ растеніе Hydrocharis; Alectorolophus, Lathraea и Astragalus glycyphyllos называются Петровымъ крестомъ; почти вст породы Cirsium именуются Осотомъ или и Татариномъ; именемъ Серпій обозначаются весьма различныя растенія, собственно такъ называется Serratula tinctoria; Matricaria Chamomilla здъсь именуется Сосонкою, другіе такъ называютъ Нірригія; весьма различныя растенія носять названіе курьей сліпоты; Trifolia называются Дятельникомъ, Клеверомъ, Коновальчикомъ; почти вст крестовники съ желтыми цвтточками именуются Сурвпицею и Горчичникомъ.

Слъдующихъ растеній показано техническое или медицинское употребленніе: Alnus (41), Salix (46) на дъланіе плетней; — Verbascum (70) для освъщенія. По словамъ Щеглова стебель Verbascum Thapsus, вымазанный смолою, употребляется вмъсто свътильника. По показанію Соболевскаго листья Verbascum nigrum, свернутые въ трубочки и сушеные идутъ на дъланіе свътильни для лампъ. Ledum (111) употребляется для куренья отъ дурнаго запаха; — Serratula tinctoria (138) на окраску въ желтый цвътъ; корни Asperula tinctoria (170), Galium rubioides (171) и boreale (172) на кра-

benennen sie alle Filices Напоротинкъ, alle Equiseta Хвощъ, Хвошовикъ; die Carices heissen Осока und, wenn sie einen sehr scharfkantigen Halm haben, Острецъ; hier heisst Polygonum Лягушинкъ, sonst wird Hydrocharis so genannt; Alectorolophus, Lathraea und auch Astragalus glycyphyllos heissen Петровъ крестъ; fast alle Cirsia werden Осотъ, auch Татаринъ genannt; mit dem Namen Серий werden sehr verschiedene Pflanzen belegt, eigentlich heisst so Serratula tinctoria; Сосонка wird hier Matricaria Chamomilla genannt, andere nennen Hippuris so; sehr verschiedene Pflanzen heissen Куря слъпота; die Trifolia heissen bald Дятельникъ, Клеверъ, bald Коновальчикъ; fast alle gelbblühenden Стисіferae werden Суръпниа und Горчичникъ genannt.

Von folgenden Pflanzen wird ein technischer oder medicinischer Gebrauch angegeben: Alnus (41), Salix (46) werden zum Flechten der Zäune benutzt; — Verbascum (70) als Lichtdochte. Nach Schtscheglow wird der Stengel von V. Thapsus mit Harz überzogen und als Fackel gebraucht; nach Sobolewsky rollt man die Blätter des V. nigrum in Röhrchen zusammen und gebraucht sie getrocknet als Dochte in den Lampen; — Ledum (111) zum Räuchern; — Serratula tinctoria (138) zum Gelbfärben; die Wurzel von Asperula tinctoria (170), Galium rubioides (171) und boreale (172) zum Rothfärben. — Ausser den schon bekannten Pflanzen werden auch noch folgende gegessen: von Viburnum

шеніе въ красный цвътъ. — Кромъ уже извъстныхъ растеній употребляются въ пищу ягоды Viburnum (176), и молодая трава Aegopodium (182). Какъ врачебными средствами пользуются растеніемъ Iris furcata (33) отъ лихорадки; — Tanacetum vulgare (165), Hypericum perforatum (258) отъ боли живота; — Rhamnus Frangula (247) отъ поносу (ягодами же этого растенія питаются медвъди); — Cynoglossum officinale (110) отъ золотухи и отъ тълеснаго сыпу; — Стеріз tectorum (122) отъ боли въ горль; — Trifolium pratense (227) и Berteroa incana (282) отъ грудной боли; — Lychnis Viscaria (269) въ глазныхъ бользней; — Chelidonium majus (290) какъ кровочистительное средство; Betonica (98) отъ бользни желтовицы; — Апtennaria dioica (142) и Berteroa incana отъ летячки; — Potentilla argentea (205) отъ укушенія бъщеных в собакъ, a Coronilla varia (238) какъ наружное средство (для насыпки на раны). Послъднее изъ сихъ растеній, имъющее какъ впрочемъ говорятъ, довитыя свойства, было уже прежде совътуемо какъ средство отъ угрызенін бъщеныхъ собакъ; — Plantago major (60) п Lysimachia vulgaris (63) употребляются какъ наружное средство въ случат портза; — Veratrum (22) и Спіdium venosum (185) служатъ для засыпки ранъ у скота какъ средство къ истреблению червяковъ; --Ranunculus acris (296) употребляется для растравленія ранъ.

С. Петербургъ, день 23 Августа 1844.

К. А. Мейеръ.

(176) die Beeren, von Aegopodium (182) die jungen Pflanzen. — Als Arzeneimittel werden benutzt Iris furcata (33) gegen das Wechselfieber; - gegen Leibschmerzen Tanacetum (165) und Hypericum perforatum (258); — gegen Durchfall Rhamnus Frangula (247), die Beeren sollen von den Bären gegessen werden; - gegen Scrofeln und Ausschlag Cynoglossum officinale (110); gegen Halsschmerzen Crepis tectorum (122); - gegen Brustschmerzen Trifolium pratense (227) und Berteroa incana (282); - gegen Augenkrankheiten Lychnis Viscaria (269); — als blutreinigendes Mittel Chelidonium (290); - gegen den Biss toller Hunde Potentilla argentea (205), und als äusserliches Mittel, zum Bestreuen der Wunden, Coronilla varia (238). Diese letztere Pflanze, die giftige Eigenschaften haben soll, ist schon früher gegen den Biss toller Hunde empfohlen worden; - Plantago major (60) und Lysimachia vulgaris (63) werden bei Schnittwunden als äusserliches Mittel angewandt; — Veratrum (22) und Cnidium venosum (185) dienen zum Bestreuen der Wunden bei dem Vieh, um die Würmer aus diesen Wunden zu vertreiben. — Ranunculus acris (296) wird benutzt, um Wunden zu erzeugen.

St. Petersburg, den 23. August 1844.

C. A. Meyer.

and as Aramanisted warden bounded bes wind and the find many and the second mentioned the manufacture with the continue of strong Burchfull Higanous Francoln 217. any of the Bare a grant and Bare a grant and and and and and and at : 1914 , Sharivilla multidigrain! milet wint. hani ad graphia - s(Elil england simple) anaromadoulell med and managed them (1866) and the maintained the cronaded shadow, transfer distributed an ana-Street Chefologian Birel Chefologian (294): engre de liste de liste de liste de liste de la liste and she immediately stiret, Aug. Sugargen der Vennten. egilling stille standard granted about the animal stiller Bongs after Labor with the souther friller gages don Frederick outline making marken: - Plantago analtr (4) and I minuachis radgeniarist, werden bei Schmittsunthe Dresertiches Milest augenment: - Verations (22) and Cai inca varnaging (125) alience gree Bestretion der Yundry let dun Viell; unrie Würner aus diesen Il unden m narta flam - Randmetalos acres (296) wird benedan

A 164 August Alla Silver 1944.

FILICES.

- 1. Struthiopteris germanica W., Spreng. Syst. Veg. IV p. 65, Mart. Prodr. Fl. Mosq. p. 186. M. S.
- 2. Pteris aquilina L., Spreng. l. c. p. 78, Mart. l. c. Папоротникъ, Папертникъ.

EQUISETACEAE.

- 3. Equisetum sylvaticum L., Spr. l. c. p. 10, Mart. l. c. p. 181. M.
- 4. Equisetum hyemale L., Spr. l. c., Mart. l. c. p. 182. M.
- Equisetum limosum L., Spr. l. c. p. 11, Mart. l. c. p. 181.
 J. Хвощовникъ; Хвощъ.

GRAMINA.

- *6. Alopecurus fulvus Sm., Koch Synops. fl. Germ. et Helv. p. 776, Weinm. Enum. No. 15., A. geniculatus Hoefft Cat. pl. Kursk. No. 51.
- *7. Alopecurus pratensis L., Koch l. c. p. 775, Weinm. Enum. No. 13., Mart. l c. p. 13, Hoefft No. 50. β. ruthenicus Weinm., Weinm. Enum. No. 14.
- 8. Phlewn pratense L., Koch l. c. p. 778, Mart. l. c. p. 13, Hoefft l. c. No. 59. M.
- *9. Setaria viridis Beauv., Koch l. c. p. 773, Weinm. Enum. No. 12, Mart. l. c. p. 12 (s. Panico), Hoefft l. c. No. 63.
- Agrostis alba L., Koch p. 781 (s. A. stolonifera), Mart. p. 15, Hoefft No 55. S.

11. Avenu pubescens L., Koch l. c. p 795.

Овесъ заячей, Кавылъ и Ковылъ лъсной. — М.

- *12. Poa bulbosa L. β. vivipara, Koch l. c. p. 802, Weinm. Enum. No. 16, Mart. l. c. p. 18 (α).
 - Poa fertilis Host., Koch l. c. p. 804, P. serotina Hoefft
 c. No. 79. M. S.
- Poa nemoralis L., Koch p. 803, Mart. p. 19, Hoefft No. 78. — S.
- Poa pratensis L., Koch p. 805, Mart. p. 18, Hoefft No. 75. S.
 γ angustifolia, Koch p. 806. S.
- Festuca ovina L., Koch p. 811, Mart. p. 20, Hoefft No. 99.
- Dactylis glomerata L., Koch l. c. p. 808, Mart. l. c. p. 20, Hoefft l. c. No 83. M.

CYPERACEAE.

*18. Carex caespivosa L., Koch l. c. p. 755, Weinm Enum. No 147, Mart. l. c. p. 166, Hoefft l. c. No. 664. Осока, Острецъ.

TYPHINEAE.

Sparganium ramosum Huds, Koch l. с. р. 682, Mart.
 l. с. р. 160, Hoefft l. с. No. 653. — Нюнка. — J.

ALISMACEAE.

20. Alisma Plantago L., Koch l. с. р 669, Mart. l. с. р. 66, Hoefft l. с. No. 291. Бъликъ. — J.

JUNCACEAE.

21 Luzula multiflora Lejeun., Koch l. с. р. 734., L. campestris Hoefft l. с. No. 279. — Кукушкины слезки. — М.

MELANTHACEAE.

22. Veratrum Lobelianum Bernh., Koch l. c. p. 724, Weinm. Enum. No. 55. — Чемерица.

ASPHODELEAE.

*23. Scilla sibirica Andr., Kunth Enum. pl. IV p. 318,

- S. amoenula Weinm Enum. No. 53, S. cernua Hoefft l. c. No. 262.
- *24. Allium rotundum L., Koch l. c. p. 718, Weinm. Enum. No. 52, Mart. l. c. p. 59, Hoefft l. c. No. 257.

ASPARAGEAE.

- 25. Asparagus officinalis L., Koch p. 704. Mart. p. 61, Hoefft No. 265 Copouie raasa S.
- Convallaria Polygonatum L., Koch l. с. р. 705, Mart.
 l. с. р. 61, Hoefft l. с. No. 266. Вороновы глазки, Сындрикъ. М. S.
- 27. Convallaria majalis L., Koch l. с., Mart. l. с. р. 61, Hoefft l. с. No. 266. Маладила, Маладильникъ, Виновникъ. J. S
- 28. *Majanthemum bifolium D. C.*, Koch p. 706, Mart. p. 30, Hoefft No. 269. Дерябка. Т.

ORCHIDEAE.

- 29. Orchis maculata L., Koch l. c. p. 687, Mart. p. 155, Hoefft No. 633.
 - β labello trifido; inflorescentia laxa. Notis indidicatis a genuina O. maculata differt. Caulis in nostra fistulosus, sicut in planta livonica atque ingrica, et nullum adhuc vidi specimen O. maculatae caule solido instructum. Ad O. Traunsteineri accedit, differt tamen caule, ut in O. maculata, foliis 7 v. 8 praedito. Змъевикъ, Кукушечън слезы. J. Т.
- *30. Orchis latifolia L., Koch l. c.?, Weinm. Enum. No. 145, Mart. l. c. p. 154, Hoefft l. c. No. 632.
- *31. Gymnadenia conopsea R. Br., Koch l. c. p. 688., Weinm. Enum. No. 146, Mart. l. c. p. 155 (sub Orchide), Hoefft l. c. No. 634.

IRIDEAE.

32. Iris Pseud-Acorus L., Koch l. c. p. 701, Hoefft l. c. No. 33, I. paludosa Mart. l. c. p. 9, Жонкиль дикой, Тюльпанъ дикой, Чиканъ. — М. U.

- 33. Iris furcata M. B., M. B. fl. taur. cauc. III, p. 42, I. bi-flora Hoefft No. 32. Касарка. U.
 - 34. Iris sibirica L., Koch p. 702, Mart. p. 9, Hoefft No. 34. Медвъжіе огурцы. Т.
 - *35. Gladiolus imbricatus L., Koch l. c. p. 699, Weinm. Enum. No. 11, Gladiolus Pall. It. III. p. 687, Hoefft l. c. No. 31. G. communis Mart. l. c. p. 9.

CONIFERAE.

36. Pinus sylvestris L., Koch l. c. p. 666, Mart. l. c. p. 172, Hoefft l. c. No. 699. Cocha.

CUPULIFERAE.

- 37. Corylus Avellana L., Koch p. 640, Mart. p. 172, Hoefft No. 698. Оръшникъ.
- 38. Quercus pedunculata Ehrh., Koch p. 639, Mart. p 171, Hoefft No. 694. Дубъ.

BETULINEAE.

- 39. Betula alba L. verrucosa Ehrh., Koch p.662, Mart. p. 171, Hoefft No. 695. Bepesa.
- 40. Betula pubescens Ehrh., Koch l. с., Hoefft No. 696. Береза. L. U.
- 41. Alnus glutinosa Gaertn., Koch p. 663, Mart. p. 168, Hoefft No. 684. Ольха.

SALICINEAE.

- 42. Populus tremula L., Koch p. 661, Mart. p. 177, Hoefft. No. 713 Осина.
- Salix pentandra L., Koch p. 642, Mart. p. 173, Hoefft.
 No. 706 Ветла, Лозина. М, J.
- 44. Salix triandra L., Koch p 644 (sub S. amygdalina β), Mart. p. 173, Hoefft No. 703. Лозина. M.
- 45. Salix livida Wahlenb., Koch p. 653 (sub S. depressa β),
 S laurina? Hoefft No. 701. Ракитникъ J.
- 46. Salix cinerea W., Koch p. 646 (sub S. daphnoide). Ива, Ракитникъ, Талъ. — J.

- Salix caprea L., Koch p. 652. Mart. p. 175, Hoefft No. 707. Таловой кусть. — Т.
- 48. Salix repens L., Koch p. 655. Ракитникъ. U.

ULMACEAE.

- Ulmus campestris L., Koch p. 637, Mart. p. 48, Hoefft
 No. 215. Илимъ J.
- 50. *Ulmus effusa W.*, Koch p. 638, Mart. p. 48, Hoefft No. 217. Вязъ. J. Т.

POLYGONACEAE.

- Polygonum Bistorta L., Koch p 617, Weinm. Enum.
 No. 57, Mart. p 71, Hoefft No. 306. -- T.
- 52. Polygonum lapathi/olium L., Koch l. c., Mart. p. 72, P. incanum Hoefft No. 310 Лягушникъ. J.
- *53. Polygonum Convolvulus L., Koch p. 619, Weinm. Enum. No. 58, Mart. p 73, Hoefft No. 312.
- *54. Polygonum dumetorum L., Koch l. c, Weinm. Enum. No. 59, Mart. p. 73, Hoefft No. 313.
- 55. Rumex aquaticus L., Koch p. 614, Mart. p. 65, R. pseud -alpinus Hoefft No. 286. Конскій щавель S.
- 56. Rumex Acetosa L., Koch p. 615, Mart. p. 65, Hoefft No. 287. Щавель. Т.
- 57. Rumex Acetosella L., Koch p. 616, Mart. p. 66, Hoefft No. 288. Щавель воробынной (mas), Щавель цвътущий (foem.). M.
- *58. Rumex maritimus L., Koch p. 612, Weinm. Enum. No 54, Mart. p. 65, Hoefft No. 285.

CHENOPODIACEAE. *)

*59. Chenopodium polyspermum L., Koch p. 606, Weinm. En. No. 42, Mart. p. 48.

^{*)} Kochia arenaria Roth., Koch l. c. p. 604, Salsola prostratae affinis Pall, it. III p. 686. Versus rivulum Tagaika. Pall.

Blitum virgatum L., Koch l. c. p. 607, Pall. l. c.

PLANTAGINEAE.

- 60. Plantago major L., Koch p. 596, Mart. p. 29, Hoefft No. 108. Подорожникъ.
- 61. Plantago media L., Koch p. 597, Mart. p. 29, Hoefft No. 109. Подорожникъ. Т.

PRIMULACEAE.

- 62. Primula officinalis Jacq., Koch p. 586, Mart. p. 36, P. veris Hoefft No. 158. Кудель-Барашки. J.
- 63. Lysimachia vulgaris L., Koch p. 581, Weinm. Enum. No. 23, Mart. p. 37, Hoefft. No. 155. Завальная трава. М.
- *64. Lysimachia Nummularia L., Koch p. 581, Mart. p. 37, Hoefft No. 157.

β longepedunculata Weinm. Enum. No. 24.

POLEMONIACEAE.

65. *Polemonium coeruleum L.*, Koch p. 493, Mart. p. 38, Hoefft No. 172. Столиственница. — J. Т.

OLEACEAE.

66. Fraxinus excelsior L., Koch p. 482, Mart. p. 176, Hoefft No. 25. Ясень.

GENTIANACEAE.

*67. Gentiana cruciata L., Koch p. 487, Weinm. Enum. No. 43, Mart. p. 49, Hoefft No. 202.

ASCLEPIADEAE.

*68. Cynanchum Vincetoxicum R. Br., Koch p 483, Weinm. Enum. No. 41, Hoefft No. 201,

SOLANACEAE.

69. *Hyoscyamus niger L.*, Koch p. 509, Mart. p. 41, Hoefft No. 166. Бълена. — М.

VERBASCACEAE.

70. Verbascum Lychnitis L., flore flavo. Koch p. 513., V.

pulverulentum Hoefft No. 169. Кулинникъ, Разнабылъ. Царскій Скипетръ. — J. L.

*71. Verbascum phoeniceum L., Koch p. 515, Weinm. Enum. No. 33, Hoefft No. 171.

PERSONATAE.

- 72. Scrofularia nodosa L., Koch p. 515, Mart. p. 109, Hoefft No. 465. Крестовникъ. U.
- 73. Linaria vulgaris Mill., Koch p. 523, Mart. p. 109, Hoefft No. 463. Поскрипникъ М.
- 74 Pedicularis comosa L., Koch p. 542, Weinm. Enum, No. 91, Mart. p. 108, Hoefft No. 462. Медовая трава. М.
- *75. Veronica spuria L., Koch p. 527.

 Var. fl. incarnato, Weinm. Enum. No. 1.

 Var. paniculata, Weinm. Enum. No. 2.
- *76. Veronica longifolia L, Koch p. 527, Weimm. Enum. No. 3, Mart. p. 5, V. maritima Hoefft No. 4.
- *77. Veronica spicata L., Koch p. 528, Weinm. Enum. No. 4, Mart. p 5, Hoefft No. 6.
- 78. Veronica latifolia L., Koch p. 526, Weinm. Enum. No. 5, Mart. p. 6, Hoefft No. 11. Кукольникъ. М. S.
- 79. Veronica austriaca L., Koch p. 526, Weinm. Enum. No. 6, Mart. p. 6, Hoefft No. 14. M.
- *80. Veronica multifida L., Koch l. c. (sub V. austriaca), Weinm. Enum No 7, V. austriacae var. foliis V multifidae Pall. It. III. p. 687.

var. tenuifolia Weinm. Enum. No 8.

- 81. Veronica Chamaedrys L., Koch p. 525, Mart p. 6, Hoefft No. 13. Вероника. М.
 - 82. Alectorolophus major Reichb., Rhinanthus major Koch p. 544, Mart. p. 106, Rh crista galli Hoefft No. 455 Петровъ кресть. М.
 - 83. Alectorolophus minor Rchb., Rhinanthus minor Koch p. 544, Mart. p. 106, Hoefit No. 457. Погромокъ. -- S.
- *84 Melampyrum arvense L., Koch p. 539, Weinm. Enum. No. 90, Mart. p. 107.

85. *Melampyrum nemorosum L.*, Koch p. 540, Mart. p. 107, Hoefft No. 458. Иванъ да Марья, Братъ съ Сестрою.

OROBANCHACEAE.

*86. Orobanche bracteata Weinm., Weinm. Enum. No 92.

LABIATAE.

- *87. Salvia nutans Waldst., Kit., Weinm. Enum. No. 9.
- *88. Salvia ruthenica Weinm., Weinm. Enum. No. 10.
 - 89. Origanum vulgare L., Koch p. 556, Mart. p 104, Hoefft No. 444. Душица.
- *90. Thymus angustifolius Pers., T. Serpyllum β Koch p. 557, Th. angustifolius Weinm. Enum. No. 88.
- 91. Thymus Marschallianus W., Koch p. 558 (s. Th pannonico), Hoefft No. 446. Душица, Чаибуръ, Чеборъ. М. U.
- 92. Acinos vulgaris Pers., Calamintha Acinos Koch p. 559, Acynos vulgaris Mart. p. 105, Thymus Acinos Hoefft No. 447. Душевикъ. М.
- 93. Nepeta Cataria L , Koch p. 562, Mart. p. 99, Hoefft No. 421. Степная мята. U.
- *94. Nepeta nuda L., Koch p. 562, Weinm. Enum. No. 83, Hoefft No. 422.
- 95. Dracocephalum Ruyschiana L., Koch p. 563, Weinm. Enum No. 89, Pall. It. III p. 687, Mart. p. 105, Hoefft No. 448. Осотъ пчелиной. М.
- Leonurus Cardiaca L., Koch p. 572, Mart. p. 103, Hoefft No. 440. — M.
- *97. Betonica stricta Ait., Koch p. 569 (sub B. officinali), Weinm. Enum. No. 84.
 - 98. Betonica hirta Rehb., Koch l. c., B. officinalis Hoefft No. 434. Буквица. М., J.
- *99. Stachys annua L., Koch p. 569, Weinm. Enum. No. 86, Mart. p. 103.

- *100. Stachys recta L., Koch p. 569, Hoefft No. 437. var. ruthenica Weinm. Enum. No. 85.
- *101. Phlomis tuberosa L, Koch p. 573, Weinm. Enum. No. 87, Mart. p. 104, Hoefft No. 442.
- *102. Ajuga genevensis L., Koch p. 575, Weinm. Enum. No 82, Mart. p. 99, Hoefft p 419.

BORRAGINEAE.

- *103. Myosotis caespitosa Schultz, Koch p. 505, Weinm. Enum. No. 25.
 - *104. Pulmonaria azurea Bess., Koch p. 503, Weinm. Enum. No. 27, Hoefft No. 144.
 - *105. Pulmonaria angusti/olia L., Koch l. c., Weinm. Enum. No. 28, Mart. p. 34.
 - 106. Symphytum officinale L., Koch p. 499, Weinm Enum. No. 31, Mart. p. 34, Hoefft p. 145. Красъ полевой. М. β lanceolatum Weinm. Enum. No. 32.
 - *107. Echium vulgare L., Koch p. 502, Weinm. Enum. No.29, Hoefft No. 140.
 - 108. *Echium rubrum Jacq.*, Koch p. 502, Hoefft No. 139. Полевой цвътъ. М.
 - *109. Echinospermum squarrosum Rchb., Weinm. Enum. No. 26.
 - 110. Cynoglossum officinale L., Koch p. 497, Weinm. Enum. No. 30, Mart p. 33, Hoefft No. 147 Собачей языкъ, Золотушная трава, Кужуха.

ERICACEAE.

111. Ledum palustre L., Koch p. 478, Mart. p. 74. Багунъ.
— М.

VACCINEAE.

112. Vaccinium Vitis idaea L., Koch p. 474, Mart. p. 70, Hoefft No. 320. Брусничникъ. — J.

CAMPANULACEAE. *)

*113. Campanula patula L., Koch p. 469, Weinm. Enum.

^{*)} Campanula Cervicaria L., Koch l. c. p. 471, Pall. l. c.

- No. 34, Mart. p. 38, Hoefft No. 176 Колокольчики. Т.
- 114. Campanula persicifolia L., Koch p. 470, Pall. It. III p. 687, Mart. p. 39, Hoefft No. 177. Цевтокъ пирошки. S.
- *115. Cumpanula Trachelium L., Koch p. 470, Weinm. Enum. No. 36, Mart. p. 39, Hoefft No. 180.
- *116. Campanula bononiensis L., Koch p. 470, Weinm. Enum. No. 35, Mart. p. 39, Hoefft No. 182.
- *117. Campanula glomerata L., Koch p. 471, Weinm. Enum. No. 37, Mart. p. 39, Hoefft No. 183.
- *118. Campanula desertorum Weinm., Weinm. Enum. No. 38.
- *119. Campanula sibirica L., Koch p. 472, Weinm. Enum. No. 39, Hoefft No. 186.

COMPOSITAE.

- 120. Taraxacum officinale Wigg., Koch p. 428, Leontodon Taraxacum Mart. p. 135, Hoefft No. 553. Дуанъ. J.
- *121 Lactuca Scariola L., Koch p. 432, Weinm. Enum. No. 123, Mart. p. 135. Hoefft No. 552.
 - 122. Crepis tectorum L., Koch p. 439, Mart. p. 138, Hoefft No 565. Дикой хмълюкъ. Т.
- *123. Crepis praemorsa Tausch., Koch p. 437, Intybus praemorsus Weinm. Enum. No. 152, Hieracium praemorsum Mart. p. 137, Hoefft No. 558.
 - 124. Picris hieracioides L., Koch p. 421, Weinm. Enum. No. 127, Mart. p. 136, Hoefft No. 556. Горлюха лъсная. J.
- *125 Hieracium Pilosella L., Koch p. 443, Weinm Enum. No. 124, Mart. p. 136, Hoefft No. 557.
- *126. Hieracium Besserianum Spr., Weinm. Enum. No. 125.
 - 127. Hieracium cymosum L., Reichb., Koch p. 449 (sub H. Nestleri), Mart p. 137. M.
- *128. Hieracium foliosum Kit? Weinm. Enum. No. 126.

- 129. Tragopogon pratensis L., Koch p. 423, Mart. p. 133, Hoefft No. 545. Козелець. J.
- *130 Scorzonera glastifolia W, S. hispanica Koch p. 425, S. graminifolia Weinm. Enum. No. 121.
- *131. Scorzonera purpurea L., Koch p. 425, Weinm. Enum. No. 122, Hoefft No. 547.
 - 132. Apargia autumnalis W., Koch p. 418(sub Leontodon.). Mart. p. 136, Hoefft No. 554. — Замошказъ. — J
 - 133. Hypochoeris maculata L., Koch p. 427, Pall. It. III p. 687, Mart p. 139, Hoefft No. 566. Молочай. М.
- *134. Carduus Thoermeri Weinm., Weinm. Enum. No. 128. (C. nutans M. Bieb. fl. taur. cauc No. 1644? Hoefit No. 572? M.).
- 135. Cirsium palustre Scop., Koch p. 393, Mart. p. 141 (s. Cnico). Мардвинъ. Т.
- *136 Cirsium glabrum De C., De Cand Prodr. VI p. 648, Weinm. Enum. No. 129.
 - 137. Cirstum heterophyllum All., Koch p. 396, Mart. p. 141 (sub Cnico), Hoefft No. 579. Осоть авсной, Татаринь. J.
- 138. Serratula tinctoria L., Koch p. 407, Mart p. 140, Hoefft No. 582, Катръ, Язышпикъ, Серпій.
- 139. Lappa minor De C., Koch p. 405, Arctium Lappa minus Mart p. 139, Arct. minus Hoefft No. 571. Janyxa. J.
- *140. Centaurea Scabiosa L., Koch p. 412, Weinm. Enum. No. 144, var. integra, Mart. p. 152, Hoefft No. 626. Пупошникъ, Шишкарникъ. S. U.
- *141. Echinops Ritro L., Koch p. 392, Weinm. Enum. No. 153.
 - 142. Antennaria dioica Gaertn., Gnaphalium dioicum Koch p. 364, Mart. p. 145, Hoefft No. 596. Золотушникъ. М. Т.
- *143. Helichrysum arenarium De C., Koch p. 365, Gnaphalium arenarium Weinm. Enum. No. 132, Hoefft No. 595

- *144. Senecio vernalis Waldst., Kit., Koch p. 386, Weinm. Enum. No. 133, Hoefft No. 604.
- *145. Senecio erucifolius L., Koch p. 387, Weinm. En. No.134
- *146. Senecio anthoraefoliu Pred?, Weinm. Enum. No. 135.
- *147. Senecio umbrosus Waldst., Kit., De Cand. Prodr. VI p. 352, Weinm. Enum. No. 137.
- *148. Senecio sarracenicus L., Koch p. 390, Weinm. Enum. No. 136.
- *149. Senecio campestris De C. var. dentatus Rchb., Koch p. 384 (sub Cineraria), Weinm. Enum. No. 140 (sub Cineraria), Hoefft No. 610 (sub Cineraria).
- *150. Teleckia speciosa Baumg., Koch p. 357, Buphthalmum cordifolium Weinm. Enum. No. 143
- *151. Inula hirta L., Koch p. 359, Weinm. Enum. No. 141, Mart. p. 148, Hoefft No. 614.
- *152. Aster Amellus L. \(\beta \) latifolius De C. Prodr. V p. 231, Nees ab Esenb. Aster. p. 45, Weinm. Enum. No. 138, — A. Amellus Hoefft No. 607.
- *153. Galaiella punctata De C. y insculpta De C. Prodr. V p. 255, G. insculpta Weinm. Enum. No. 139.
- *154. Linosyris vulgaris Cass., De C. Prodr. V p. 352, Chrysocoma Linosyris Koch p. 351, Weinm. Enum. No. 130, Hoefft No. 589.
- *155. Linosyris villosa De C., D. C. Prodr. V p. 352, Weinm. Enum. No. 130 (sub Chrysocoma).
 - 156. Anthemis tinctoria L., Koch p. 375, Mart. p. 151, Hoefft No. 620. Дикая Рябинка. J.
 - 157. Achillea Millefolium L., Koch p. 372, Mart. p. 151, Hoefft No. 622. Растиральникъ, Тысячалистникъ.
 - 158. Artemisia procera W., De C. Prodr. VI p. 108, Weinm. Enum. No. 131? Мужичекъ, Боже деревцо, Бодренникъ. L.
- 159. Artemisia inodora M. B., De C. Prodr. VI р. 96, Hoefft No. 592 (р. р.). Бълокорка. S. U.
- 160. Artemisia vulgaris L., Koch p. 369, Mart. p. 144, Hoefft No. 594. Чернобыльникъ.

- 161. Artemisia Absinthium L., Koch p. 365, Mart. p. 144, Hoefft No. 593. Польнь.
- 162. Leucanthemum vulgare Lam., De C. Prodr. VI p. 46, Chrysanthemum Leucanthemum Koch p. 378, Mart. p. 149, Hoefft No. 616. Бълій цвъть, Ромашка полевая. М., J.
- 163. Matricaria Chamomilla L., Koch p. 377, Mart p. 150, Ромашка полевая, Сосонька. М.
- 164. *Pyrethrum corymbosum W.*, Koch p. 379, Weinm. Enum. No. 142, Mart. p. 149, Hoefft No. 617 Курья слепота. Ромашка. L.
- Tanacetum vulgare L., Koch p. 370, Mart. p. 144, Hoefft No. 590. Козельникъ, Дикая рябина, Сузикъ.
- *166. Xanthium strumarium L., Koch p. 462, Weinm. Enum. No. 148, Mart. p. 169, Hoefft No. 687.

DIPSACEAE.

167. Succisa pratensis Mönch., Koch p. 344, Scabiosa Succisa Ledeb. fl. ross. II p 458, Mart. p. 62, Hoefft No. 106. Далиха. — J.

VALERIANACEAE.

- 168. Valeriana exaltata Mik., Koch Synops. ed. secund. р. 369, Ledeb. l. с. р. 438. Серпій. — J.
- Valeriana officinalis L., Koch l. с., Ledeb. l. с.,
 Mart. p. 9, Hoefft No. 30. Купыръ лъсной, Аверьянъ.
 М. J.

RUBIACEAE.

- 170. Asperula tinctoria L., Koch p. 327, Ledeb. l. c. p. 398, Hoefft No. 124. Мужичекъ. L.
- *171. Galium rubioides L., Koch p. 332, Ledeb. l. c. p. 410, Weinm. Enum No. 18, Mart. p. 27, Hoefft No. 113. Марена. S.

 β angustifolium Weinm. l. c. No. 19.
 - 172. Galium boreale L., Koch p. 332, Ledeb. l. c. p. 412,

- Weinm. Enum. No. 21, Mart. p. 29, Hoefft No. 119. Марена. L.
- Galium palustre L., Koch p. 331, Ledeb. l. c. p. 408,
 Mart. p. 27, Hoefft No. 114. M. T.
- 174. Galium verum L., Koch p. 332, Ledeb. l. c. p. 414, Weinm. Enum. No. 20, Mart. p. 28, Hoefft No. 116. Ръзучая трава, Мужичекъ. — М.
- Galium Mollugo L., Koch p. 333, Ledeb. l. c. p. 407.
 Mart. p 28, Hoefft No. 117. T.

CAPRIFOLIACEAE.

- 176. Viburnum Opulus L., Koch p. 324, Ledeb. l. c. p. 384, Mart. p. 56, Hoefft No. 248. Калина.
 - 177. Lonicera Xylosteum L., Koch p. 325, Ledeb. l. c. p. 388, Mart. p. 40. Жимолость. М.

UMBELLIFERAE.

- *178. Eryngtum intermedium Weinm., Weinm. Enum. No 45, Ledeb. l. c. p 239, E. planum Hoefft No. 218.
- '179. Petroselinum Thörmeri Weinm., Weinm. Enum. No. 46. Ledeb. l. c. p. 242.
- *180. Falcaria Rivini Host., Koch p. 285, Ledeb. l. c. p. 245, Sium Falcaria Weinm. No. 48, Hoefft No. 233.
 - 181. Falcaria carvifolia m. F. radice fusiformi; foliis bipinnatisectis: segmentis multifidis, infimis ad petiolum communem decussatis: laciniis linearibus acuminatis integerrimis margine scabris; involucris involucellisque nullis.

Monstrositatem fere Cari Carvi simulat, sed accuratius examinata notis sequentibus ab illo differt: 1) foliorum segmentis elongatis, laciniis nonnihil latioribus; 2) umbellae radiis elongatis gracilibus; 3) calycis denticulis manifestis; 4) petalis minus profunde emarginatis; 5) cremocarpiis elongatis, illis Falcariae Rivini omnino similibus; 6) odore fere nullo, vel saltem non Carvi; — cum descriptione Petroselini Thörmeri

Weinm. plurimis notis convenit, sed involucri involucellorumque defectu longe distat.

Planta erecta, subbipedalis, glabra flavescentivirens. Radix perennis? fusiformis, intus alba, extus flavescenti-fuscescens, apice non comata. Caulis angulatus, sulcatus, a basi ramosus: rami erecto-patuli, elongati. Folia illis Cari Carvi similia; inferiora petiolo longo sulcato basi breviter vaginato fulta, bitripinnatisecta: rami primarii elongati, inferne nudi; segmenta multifida, infima ad rachidem decussata; laciniae elongatae, lineares, lineam fere latae, acuminatae, margine denticulis minutis cartilagineis scabrae. Folia caulina superiora supra vaginam modice dilatatam margine non scariosam sessilia, inferioribus omnino similia, sed minus dissecta. Caulis et rami superne nudi atque aphylli, umbella circiter 16-radiata terminati. Umbellae radii filiformes, basi paulo incrassati, exteriores 11/2 poll circ. longi, centrales breviores. Umbellulae subsedecim-radiatae; radii tenuissimi, exteriores semipollicares. Involucra involucellaque nulla. Flores Falcariae Rivini omnino similes, albi; centrales saepe steriles. Calycis margo denticulis 5 parvis patentibus instructus. Petala aequalia, basi attenuata, apice leviter obcordata cum apiculo incurvato. Filamenta elongata. Antherae parvae, flavae. Cremocarpia immatura elongata, 3 lin. circ. longa, sublinearia, a latere modice contracta. Mericarpia ovulo pendulo foeta, quinquejugata: jugis filiformibus obtusis, lateralibus marginantibus; valleculae vitta filiformi notatae; commissura bivittata. Stylopodium parvum, immarginatum, profunde bifidum: lobis pulvinato-subconicis stylo brevi erectopatulo terminatis.

Hab. in provinciae Tambow districtu Jelatomsk, ubi haec planta Анисъ vocatur.

182. Aegopodium Podagraria L., Koch p. 286, Ledeb l. c.

- р. 247, Mart. p. 56, Hoefft No. 221. Купыръ болотный, Снить.
- 183. Carum Carvi L., Koch p. 286, Ledeb. l. c. 248, Mart. p. 55, Hoefft No. 222. Тминъ.
- *184. Seseli coloratum Ehrh., Koch p. 295, Ledeb. l. c. p. 277, Weinm. Enum. No. 49, S. annuum Hoefft No. 220.
- 185. Cnidium venosum Koch, Koch p. 297, Ledeb l. с.р. 283, Imperatoria Chabraei Hoefft No. 244. Сурикъ, U.
- *186. Rumia leiogona m., Ledeb. l. c. p. 281.

 a glabra, Weinm. Enum. No. 47 (sub Trinia).
 - 187. Angelica montana Schl., Koch p. 301, Ledeb. l. c. p. 295. Купыръ. М.
 - 188. Pastinaca sativa L., Koch p. 307, Ledeb. l. c p. 317, Mart. p. 55, Hoefft No. 239. J.
 - 189. Laserpitium pruthenicum L., Koch p. 311, Ledeb. l.c. p. 336, Hoefft No. 247. J.
 - 190. Anthriscus sylvestris Hoffm., Koch p. 315, Ledeb. l. c. p. 346, Chaerophyllum sylvestre Mart. p. 54, Hoefft No. 231. Купыръ красный. M. S.
- *191. Conium maculatum L., Koch p. 319, Ledeb. l. c p. 359, Weinm. Enum. No. 50, Mart. p. 50, Hoefft No. 234.

LYTHRARIACEAE.

192. Lythrum virgatum L., Koch p. 247, Ledeb. II p. 128, Hoefft No. 359. — S.

ONAGRARIAE.

- 193. Epilobium angustifolium L., Koch p. 239, Ledeb. l. c. p. 105, Mart. p. 68, Hoefft No. 295. Красной цвътокъ. М. S.
- *194. Epilobium hirsutum L., Koch p. 239, Ledeb. l. c. p. 107, Weinm. Enum. No. 56, Mart. p. 68, Hoefft No. 296.

PARONYCHIACEAE.

*195. Herniaria glabra L., Koch p. 254, Ledeb. l. c. p 159, Weinm. Enum. No. 44, Mart. p. 46, Hoefft No. 214.

CRASSULACEAE. *)

196. Sedum Telephium L., Koch p. 258, Mart p. 80, Hoefft No 347, S. vulgare Ledeb. l. с p. 180. Заячья капуста. — М.

GROSSULARIEAE.

- 197. Ribes rubrum L., Koch p. 265, Ledeb. II. p. 199, Mart. p. 43. Смородина красная. — Т.
- 198. Ribes nigrum L., Koch p 265, Ledeb. l. c. p. 200, Mart. p. 43, Hoefft No. 199. Смородина черная. — М. Т.

ROSACEAE.**)

- 199. *Pyrus Malus L. sylvestris*, Koch р 235, Ledeb. l. c. р. 96. Hoefft No. 367. Яблоня лъсная.
- 200. Scorbus aucuparta L., Koch p. 236, Mart. p. 86, Hoefft No. 305, Pyrus aucuparia Ledeb. l. c. p. 100. Рябина.
- 201. Rosa cinnamomea L., Koch p. 224, Ledeb. l. c. p. 76, Mart. p. 87, Hoefft No. 370. Шиповникъ. М. Т.
- *202. Sangui orba officinalis L., Koch p. 232, Ledeb. l. c. p. 27, Weinm. Enum. No. 22, Mart. p. 30, Hoefft No. 112.
 - 203. Alchimil'a montana W., A. vulgaris β Koch p. 231, Ledeb. l. c. p. 29. Запальникъ, Лапушникъ малой. М.
 - 204. Agrimonta Eupatoria L., Koch p. 220, Ledeb. l. c. p. 31, Mart. p. 85, Hoefft No. 364. Донна. J.
 - 205. Potentilla argentea l., Koch p. 214, Ledeb. l. c. p. 47, Mart. p. 89, Hoefft No. 379. Собачка. — М. U.
 - 206. Comarum palustre L., Koch p 212, Ledeb. l. c. p. 62, Mart. p. 91, Hoefft No. 388. Декопій. — J.
- 207. Fragaria collina Ehrh., Koch p. 211, Ledeb. l. c.

^{*)} Sempervirum globifero simile, Pall. It. III, p. 687. — Hab. in collibus sabulosis versus rivulum Tagaika, Pall. —

^{**)} Prunus spinosa L., Koch l. c. p. 203, Ledeb. l. c. II p. 4, Schleedorn Pall. It. III p. 687. — Hab. prope Panowy-Kusty, Pall.

- р. 64, Mart. p. 88, Hoefft No. 375. Клубинка полевая, Клубинчникъ. М. J. Т.
- 208. Fragaria vesca L., Koch l c., Ledeb. l. c. p. 63, Mart. p. 88, Hoefft No. 374. Земляника, Ягода пазынока.
- 209. Rubus caesius L., Koch p 210, Ledeb l c. p. 66, Mart. p. 87, Hoefft No. 372. Ежевика J.
- 210. Rubus idaeus L., Koch p. 210, Ledeb. l. c. p. 65, Mart. p. 87, Hoefft No. 371. Малина, Малинникъ.
- 211. Rubus saxatilis L., Koch p. 211, Ledeb. l. с. p. 69, Mart p. 88, Hoefft No. 373. Каменка, Каменика, Костяника. М, J.
- 212. Ceum rivale L., Koch p. 209, Ledeb. l. c. p. 23, Mart. p. 91, Hoefft No. 387. Серпій лъсной, Трава листь. М., L.
- *213. Spiraea crenata L., Ledeb. l. c. p. 11, Weinm. Enum. No. 71
- 214. Spiraea Filipen lula L., Koch p. 208, Ledeb. l. c. p. 16, Mart p. 86, Weinm. Enum. No. 72, Hoefft No. 368. Кашка, Пухъ. М. U.
- 215. Spiraea Ulmaria L., Koch p. 208, Ledeb. l. с. p. 18, Mart. p. 86, Hoefft No. 369. Бълоголовецъ, Скрипій, Топырка.

var. denudata

- 216. Prunus Padus L., Koch p. 207, Ledeb. l. с. p. 8, Mart. p. 85. Hoefft No. 362. Черемуха.
- 217. Prunus Chamaecerasus Jacq., Koch p. 207, Ledeb. II p. 6, P. fruticosa Pall., Wilde Kirschen Pall. It. p. 687. Вишня. U.
- *218. Amygdalus nana L, Koch p. 205. Ledeb. l. c. p. 1, Weinm. Enum. No. 70.

LEGUMINOSAE.

219. Genista tinctoria L., Koch p. 153, Ledeb. l. c. I. p. 516, Mart. p. 123, Hoefft No. 510. Дрокъ. — М. L. S.

- *220. Genista ovatu Waldst., Kit., Koch p. 153, Ledeb. l. c. I. p. 517, Weinm. Enum. No 101.
- 221. Cyttsus ratisbonensis Schäffer, Koch Synops. ed. secund. p. 171, C. biflorus Ledeb. l. c. p. 520, C. supinus Weinm. Enum. No. 106, Mart. p. 127, Hoefft No. 525, C. ruthenicus Fisch. Щакатавникъ. М. Т.
- *222. Medicago lupulina L., Koch p. 161, Ledeb. l. c. p. 527, Weinm. Enum. No. 118, Mart. p. 132, Hoefft No. 541.
- *223. Melilotus officinalis W., Koch p. 166, Ledeb. l. c. p. 537, Weinm. Enum. No. 113, Mart. p 128.
- 224. Melilotus Petitpierreana W., Koch p. 167, Ledeb. l. c. p. 537 (s. M. officinali), M. officinalis Hoefft No. 530 Донникъ. М. U.
- *225. Melilotus vulgaris W, Koch p. 166, Weinm. Enum. No. 114. Mart. p. 128, M. alba Ledeb. l. c. p. 536, M. officinalis β Hoefft No. 530.
- Trifolium alpestre L., Koch p. 168, Ledeb. l. c. p. 546, Weinm. Enum. No. 115, Mart. p. 130, Hoefft No. 535.
 Клеверъ, Конавальчикъ. М. U.
 β flore albo. Weinm. Enum. No. 116.
- 227. Trifolium pratense L., Koch p. 168, Ledeb. l. c. p. 547, Mart. p. 129, Hoefft No 533. Дительникъ лъсной, Дятельникъ подорожникъ.
- *228. Trifolium arvense L., Koch p. 170, Ledeb. l. c. p. 540, Weinm. Enum. No. 117, Mart. p. 130, Hoefft No. 536.
- 229. Trifolium montanum L., Koch p. 172, Ledeb. l. c. p. 552, Mart. p. 130, Hoefft No. 537. Коновникъ, Коновальчикъ. М. U.
- 230. Trifolium hybridum L, Koch p. 174, Ledeb. l. c. p. 554, Mart. p 129, Hoefft No. 531. Дятельникъ. М.
- 231. Trtfolium repens L., Koch p. 173, Ledeb. l. с. p. 553, Mart. p. 129, Hoefft No. 532. Дятельникъ бълій. М.
- 232 Trifolium agrarium L., Koch p. 175, Ledeb. l. c. p. 556, Mart. p. 131, Hoefft No. 538. M.
- 233. Trifolium spadiceum L., Koch p. 175, Ledeb. l. c. p. 555, Mart. p. 130. Хмъль луговой дикой. J.

- *234. Oxytrop's pilosa D. C., Koch p. 181, Ledeb. l. c. p. 584, Weinm. Enum. No. 109.
- *235. Astragalus hypoglottis L., Koch p. 183, Ledeb. l. c. p. 602, Weinm. Enum. No. 110.
- *236. Astragalus Onobrychis L., Koch p. 183, Ledeb. l. c. p. 608, Weinm. Enum. No. 111.
 - 237. Astragalus glycyphyllos L., Koch p. 185, Ledeb. l. c. p. 621, Mart. p. 128, Hoefft No. 529. Петровъ крестъ. U.
 - 238. Coronilla varia L., Koch p. 188, Ledeb. l. c. p. 696, Weinm. Enum. No. 107, Mart. p. 127, Hoefft No. 526. Рябчикъ. S.
- *239. Onobrychis sativa Lam., Koch p. 190, Ledeb. l. c. p. 708, Hoefft No. 527.

 β subvillosa D. C., Weinm. Enum. No. 108.
 - 240. Vicia Cracca L., Koch p. 193, Ledeb. l. c. p. 674, Mart. p. 125, Hoefft No. 519. Горомъ журавлиной, Горошекъ, Повителъ. var. speciosa Weinm. Enum. No. 105.
 - 241. Vicia sepium L., Koch p. 195, Ledeb. l. c. p. 669, Mart. p. 126, Hoefft No. 522. Горохъ луговой. — J.
- *242. Lathyrus pisiformis L., Ledeb. l. c. p. 685, Weinm. Enum. No. 104, Hoefft No. 516.
- *243. Lathyrus tuberosus L., Koch p. 200, Ledeb. l. c. p. 682, Weinm. Enum. No. 103, Mart. p. 124.
 - 244. Lathyrus pratensis L., Koch p. 201, Ledeb. l. c. p. 683, Mart. p. 124, Hoefft No. 513. Горохъ мышй. — J.
 - 245. Orobus vernus L., Koch p. 202, Ledeb. l. c. p. 688, Mart. p. 124, Hoefft No. 511. Горохъ мышиной. J.
- *246. Orobus Gmelini Weinm., Ledeb. l. c. p. 692, Weinm. Enum. No. 102 (excl. tamen syn. Gmelini, omnino ad O. venosum angustifolium spectante). Num ab O. pallescente diversus?

RHAMNACEAE.

247 Rhamnus Frangula L., Koch p. 150, Ledeb. l. c.

р. 503, Mart. p. 42, Hoefft No. 187. Карлушина, Крушина.

CELASTRINEAE.

- 248. Evonymus europaeus L., Koch p. 147, Ledeb. l. с. p. 497, Mart. p 43, Hoefft No. 196. Бересклеть.
 U.
 - 249. Evonymus verrucosus Scop., Koch p. 147, Ledeb. l. c. p. 498, Mart. p. 43, Hoefft No. 197. Бересклетъ. J., L.

EUPHORBIACEAE.

- *250. Euphorbia desertorum Weinm., Weinm. Enum. No. 149.
- *251. Euphorbia Cyparissias L., Koch p. 631, Weinm. Enum. No. 150.
- 252. Euphorbia virgata W. K., Koch p. 632, E. Esula Hoefft No. 360. Раминовый корень, Раминовое зелье.
 U.

ACERACEAE.

- 253. Acer platanoides L., Koch p. 136, Ledeb. l.c. p. 456, Mart p. 69, Hoefft No. 302. Клень.
- 254. Acer tataricum L., Ledeb. l. c. p. 454, Mart. p. 69, Hoefft No. 301. Чернокленникъ, Лимокъ М. L. U.

GERANIACEAE.*)

- Gerantum sanguineum L., Koch p. 139, Ledeb. l. с. p. 460, Weinm. Enum. No. 98, Pall. It. III p. 687, Mart. p. 119, Hoefft No. 500. Крестовая трава. М.
- *256. Geranium sylvaticum L., Koch p. 138. Ledeb. l. c. p. 464, Weinm. Enum. No. 99, Mart. p. 119, Hoefft No. 501.
 - 257. Geranium pratense L., Koch p. 138, Ledeb. l. c. p. 466, Mart. p. 119, Hoefft No. 502. Камчужная трава.
 Т.

^{*)} Geranium palustre L., Koch l. c. p. 139, Ledeb. l. c. p. 467, Pall. It. III p. 687, Mart. p. 119. — Versus rivulum Tagaika, Pall.

HYPERICACEAE.

258. Hypericum perforatum L., Koch p. 133, Ledeb. l. c. p. 447, Weinm. Enum. No. 119, Mart. 133, Hoefft No. 543. Звъробой.

259. Hypericum quadrangulare L., Koch p. 134, Ledeb.l. c. p. 448 Hoefft No. 542, H. dubium Mart.

р. 132. Звъробой. — Ј.

*260. Hypericum hirsutum L., Koch p. 135, Ledeb. l. c. p. 449, Weinm. Enum. No. 120, Mart. p. 133, Hoefft No. 544.

TILIACEAE.

261. Tilia intermedia D. C., Koch p. 133 s. T. parvifolia, Ledeb l. c. p. 441. Липа.

LINACEAE.*)

*262. Linum flavum L., Koch p. 127, Ledeb. l. c. p 423. Weinm. Enum. No. 51, Mart. p. 58, Hoefft No. 252.

ALSINEAE.

- *263. Arenaria longifolia M.B., Ledeb l.c. p. 362, Weinm. Enum. No. 68.
 - 264. Stellaria holostea L., Koch p. 119, Ledeb. l. c. p. 381,
 Weinm. Enum. No. 63, Mart. p. 79, Hoefft No. 339
 S.
 - 265. Stellaria graminea L., Koch p. 119, Ledeb. l. c. p. 391, Mart. p. 79, Hoefft No. 340. Мълкій цвътокъ. М.
- 266. Cerastium triviale Link, Koch p. 122, C. vulgatum Ledeb. l. c. p. 408, Mart. p. 82, Hoefft No. 353.

CARYOPHYLLACEAE

- 267. Lychnis chalcedonica L., Ledeb. l. c. p. 330, Weinm. Enum. No. 69, Pall. It. III р 687. Дикое мыло. S
- 268. Lychnis Flos cuculi L., Koch p. 107, Ledeb. l. c. p. 330, Mart. p. 81, Hoefft No 351. Дрема. М.

^{*)} Linum perenne Linn, Koch l. c. p. 128, Ledeb. l. c. p. 426, Pall. Itin. III p. 687. Versus rivul. Tagaika. Pall.

269. Lychnis Viscaria L., Koch. p. 106, Ledeb. l. c. p. 328 (sub Viscaria vulgari), Mart. p. 81, Hoefft No. 349. Дремучка, Сарочань, Калмыңкое мыло.

270. Lychnis vespertina Sibth., Koch p. 107, Melandryum pratense Ledeb. l. c. p. 327, Lychn. pratensis Mart. p. 81, L. dioica Hoefft No. 350. Щелкунецъ лъсной, Куколь лъсной.

271. Silene Otites Sm, Koch p. 102, Ledeb l. c. p 309 (excl. syn. pl. et var. β). — M.

β hermaphrodita. Weinm. Enum. No. 65.

*272. Silene viscosa Pers., Koch p. 101, Ledeb. l. c. p. 313, Mart. p. 78 (s. Cucubalo).

β latifolia. Weinm Enum. No. 64 (s. Cucubalo).

- 273. Silene nutans L, Koch p. 102, Ledeb. l. c. p. 318. Weinm. Enum. No. 66, Mart. p. 78, Hoefft No. 337. Слъпецъ. М. Т.
- *274. Silene chlorantha Ehrh., Koch p. 102, Ledeb l. c. p. 319, Weinm. Enum. No. 67.
- *275. Dianthus Carthusianorum L., Koch p. 95, Ledeb. l. c. p 275, Weinm. Enum No. 61.
- *276. Dianthus superbus L., Koch p. 98, Ledeb. l. c. p. 285, Weinm Enum. No. 62, Hoefft No. 334.
- *277. Gypsophila muralis L., Koch p. 93, Ledeb. l. c. p. 288, Weinm. Enum. No.60, Hoefft No 329, Pall. It. III p. 687. POLYGALACEAE.
- *278. Polygala vulgaris L., Koch p. 91, Ledeb. l. c. p. 270, Weinm. Enum. No. 100, Mart. p. 123.

VIOLARIACEAE.

- *279. Viola canina L, Koch p. 85, Ledeb. l. c. p 252, Weinm. Enum. No. 40, Mart p. 44, Hoefft No. 191

 CRUCIFERAE *).
 - 280. Barbarea stricta Andrz., Koch p. 36, Ledeb. l. c. p. 115. T.

^{*)} Hesperis tristis L., Koch l. c. p. 46, Ledeb. l. c. p. 171, Pall. It. III p. 687. — Hab. versus rivulum Tagaika, Pall.

- 281. Turritis glabra L., Koch p. 37, Ledeb. l. c. p. 116, Mart. p. 116, Hoefft No. 485. Адалимъ, Молодика. Т.
- 282. Berteroa incana De C., Koch p. 60 (s. Farsetia), Ledeb. l. c. p. 135, Mart. p. 113 (s. Alysso), Hoefft No. 472. Кашка лъсная. — Т.
- *283. Erysimum strictum fl. Wetter., Koch p. 51, Ledeb. l. c. p 189, Weinm. Enum No. 95.
- *284. Sisymbrium junceum M. B., Ledeb. l. c. p. 177, Weinm. Enum. No. 96.
- *285. Sisymbrium pannonicum Jacq., Koch p. 48, Ledeb. l. c. p. 179, Weinm. Enum. No. 97, S. Columnae δ Hoefft No. 493,

286. Sisymbrium Loeselii L., Koch p. 47, Ledeb. l. c. p. 178, Mart. p. 116. Горчичникъ. — Т.

*287. Neslia paniculata Desv., Koch p. 76, Ledeb. l. c. p. 214, Weinm. Enum. No. 94, Hoefft No. 478, Mart. p. 111 (s. Myagro).

288. Bunias orientalis L., Koch p. 77, Ledeb. l. c p. 226 Weinm Enum. No. 93, Mart. p. 111, Hoefft No. 480. Редька дикая, Суръпица, Гарлуппикъ.

FUMARIACEAE.

*289. Fumaria officinalis L., Koch p. 33, Ledeb. l. c. p. 105, Weinm. Enum. No. 151, Mart. p. 122.

PAPAVERACEAE.

290. Chelidonium majus L., Koch p. 31, Ledeb. l. c. p. 91, Mart. p. 91, Hoefft No. 392. Чистякъ. — Т.

RANUNCULACE AE.

- *291. Delphinium elatum L., Koch p. 22, Ledeb. l. c. p. 63, Weinm. Enum. No. 73. Mart. p. 93.
 - 292. Caltha palustris L., Koch p. 19. Ledeb. l. c. p. 48, Mart. p. 98, Hoefft No. 417. J.
- *293. Ranunculus illyricus L., Koch p. 16, Ledeb. l. c. p. 30, Weinm. Enum. No. 76.

- *294. Ranunculus Lingua L., Koch p. 15, Ledeb. l. c. p 31, Weinm. Enum. No. 77, Mart p. 96, Hoefft No 408.
 - 295. Ranunculus repens L., Koch p. 18, Ledeb. l. c. p. 43, Mart. p. 97, Hoefft No. 412 M.
- 296. Ranunculus acris L., Koch p 17, Ledeb. l. c. p. 40, Mart p. 97, Hoefft No. 414. Лютикъ, Кленовой цвътъ, Сильный цвътъ.
- *297. Adonis vernalis L., Koch p. 10, Ledeb. l. c. p. 24, Weinm. Enum. No. 74, Hoefft No. 407.

 β major Weinm. Enum. No. 75.
- *298. Anemone sylvestris L., Koch p. 9, Ledeb. l. c. p. 16, Weinm. Enum. No. 79, Mart. p. 95, Hoefft No. 406.
- 299. Pulsatilla patens Mill., Koch p. 8 (s. Anemone), Ledeb. l. c. p. 19, Weinm. Enum. No. 78, Hoefft No. 404. Разлапушникъ. — М.
- *300. Thalictrum minus L., Ledeb. l. c. p. 8, Weinm. Enum. No. 80, Mart. p. 95.
- 301. Thalictrum simplex L.?, Koch p. 5, Ledeb. l. c. p. 10. Specimina adsunt valde incompleta, nondum florentia; radice repente et foliis pinnatim decompositis ad T simplex accedunt, sed foliola latiora, saepe subrotunda. T.
- *302. Thalictrum flavum L., Koch p. 6, Ledeb l. c. p. 12, Weinm. Enum. No. 81, Mart. p. 95.

Omissa.

ARISTOLOCHIEAE.

303. Aristolochia Clematitis L., Koch p. 625, Mart. p. 158, Hoefft No. 645. Финовникъ. — S.

Compositae.

304. Cirsium incanum Fisch., De C. Prodr. VI p. 643, C. arvense & Koch p. 400. Осоть. — S.

Index Ordinum.

							No.	1	D	ţ			. ,	1.5		No.
Aceraceae					•		253.	Juncaceae								21.
Alismaceae							20.	Labiatae								87.
Alsineae							263.	Leguminosa	e							219.
Aristolochieae .							303.	Linaceae								262.
Asclepiadeae .	. ,			4			68.	Lythrariace	eae		91			-		492.
Asparageae .							25.	Melanthace	ae			٠.		۲.		22.
Asphodeleae .							23.	Oleaceae								66.
Betulineae .							39.	Onagrariae	•							193.
Borragineae . :							103.	Orchideae								29.
Campanulaceae		•		•	1.7		413.	Orobanchac	eae	9		•				86.
Caprifoliaceae .	. #	•			Je 1	, .	176.	Papaverace	ae		٠,	•		4		290.
Caryophyllaceae				٠				Paronychia								195.
Celastrineae								Personatae								72.
Chenopodiaceae							59.	Plantaginea	e							60.
Compositae					12	0,	304.	Polemoniac	eae							65.
Coniferae	٠.		•				3 6.	Polygalacea	e			ě	. 1	÷		278.
Crassulaceae .							196.	Polygonacea	ae							31.
Cruciferae							280.	Primulacea	е							62.
Cupuliferae	4.						37.	Ranunculac	eae				•	•		291.
Cyperaceae							18.	Rhamnacea	е							247.
Dipsaceae						, .		Rosaceae								199.
Equisetaceae .								Rubiaceae								170.
Ericaceae							111.	Salicineae								42.
Euphorbiaceae.							250 .	Solanaceae								69.
Filices							1.	Tiliaceae								261.
Fumariaceae .							2 89.	Typhineae	•	•	•		:			19.
Gentianaceae .							67.	Ulmaceae								49.
Geraniaceae						,	255.	Umbellifera	e		•	•			•	178.
Gramina							-	Vaccineae		•	•					112.
Grossularieae .	•	•					197.	Valerianace	ae							168.
Hypericaceae -	•							Verbascacea				•				70.
Irideae							32.	Violariaceae	е	•	•	•				27 9.

Index nominum rossicorum.

No.	No.
Аверьянъ	
Адалимъ	
Анисъ	. 268.
Багунъ	. 269.
Береза	. 219.
Берескиетъ 248 , 249. Дуанъ	. 120.
Болрениях	. 33.
Божье деревцо	. 92.
Брать съ сестрою 85. Душица	9, 91.
Брусинченкъ	. 230.
Буквица	. 231.
Бълена 69. " лъсной	. 227.
Бълги цвътъ	. 227.
Бъликъ 20. Ежевика	. 209.
Бълоголовенъ	. 177.
Бълокорка	. 32.
Ветоника	. 63.
Ветла	. 132.
Виновинкъ	. 203.
Вошия	. 196.
Вороновы глазки 26. Заячей овесъ	. 11.
Вязъ	8, 259.
Гарлуппикъ	. 208.
Горлюха лъсная	. 29.
Горохъ журавлиной 240. Золотушная трава	. 110.
,, луговой	. 142,
" мышій 244, 245, Ива	. 46.
	. 85.
Горчичникъ 286. Наимъ	
Далиха	
Декопій	. 176.
Дерябка	
Дикав Рябинка 156, 165, Каменига	. 211.
	. 211.
Дикой хитьлюкъ 122. Камчужная трава	
1	

No	No.
Карлушина	
	1
Кашка лъсная	
Клеверъ	
Кленовой цвътъ	
Кленъ	*
Клубника полевая 207	
Клубничникъ 207	•
Ковыль лъсной 11	10
Козелецъ	
Козельникъ 168	В Овесъ заячей
Колокозьчики	Ольха 41.
Коновальчикъ 226, 229	Оръшникъ
Коновникь	Осина 42.
Костяника 21	. Осока 18.
	Осотъ
Красъ полевой 100	. Осотъ <i>д</i> ъсной 137.
Крестовая трава 253	. , пчелиной 95.
Крестовникъ 79	2. Острецъ
Крушина	. Папертникъ 2.
Кудель-Барашки 6	Папоротникъ 2.
	. Петровъ крестъ 82, 237.
	. Повитель
	В. Погромокъ 83.
3	D. Подорожникъ 60, 61.
	. Полевой цвътъ 108.
). Полынь
Купыръ	7. Поскрипникъ
	2. Пупошникъ
	Пухъ
" лъсной 16	. Разлапушникъ
Курья слапота	1. Разнабылъ 70.
	Ракитанкъ 45, 46, 48.
	5. Раминовое зелье
	7. Раминовое зелье
Липа	1. Растиральникъ
Лозина	
Долина	
Лютикъ	В. Ромашка
Лягушникъ	2. Ръзучая трава
	I AUGHA
Маладильникъ 2	7. Рябчикь

						No				1	Vo.
Сарочань						269.	Филовникъ			. 3	03.
Серпій				13	8,	168.	Хвощовникъ				5.
Серпій лъсной						212.	Хвощъ				5.
Снаьный цвать						296.	Хяваь лучовой дикоі	i .		. 2	33.
Скрипій						215.	Хмълюкъ дикой			. 1	22.
Слъпецъ						273.	Царскій скипетръ .				70.
Смородина красн	as	.]				197.	Цвътокъ пирошки .	1.		. 1	14.
Смородина черна						198.	Чанбуръ				91.
						182.	Чеборъ				91.
Собачей изыкъ						110.	Чемерица				22.
Собачка							Черемуха			. 2	16.
Сорочіе глаза	9			10			Чернобыльникъ		8 4		60.
Сосна							Червокленникъ		60		54.
Сосонька							Чиканъ				32.
Степная мята							Чистякъ			. 2	90.
Столиственница	. Tu					65.	Шиповникъ			. 2	01.
Сузикъ						165.	Шишкарникъ		U.N	. 1	40.
Сурнкъ	Pg	91	n.	314	5		Щавель	A	=	71	56.
Суръпица							Щавель воробыной	3	rod!	10	37.
				11			, конскій		4		55.
Таловой кустъ						47.					57.
Таль							Щакатавникъ			. 9	221.
Татаринъ		no.					Щелкунецъ лъсной.		HI TO	. 5	270.
Тиназ	97	10	Dij	A			Яблоня лъсная .	101	7 =	- 7 5	199.
							Ягода Пазынока	not		1.79	208.
							Язышникъ	10.			138.
Тысяча - листвик							Ясень				66.
Тюльпанъ дикой		93	69		-						
докон		•		•		. 02	or F. M. S. V. Hoell		26.1	oud.	
				_		*	-				

Verzeichuiss der citirten Werke.

. . воврем свикория.

- Koch = Synopsis Florae Germanicae et Helveticae etc. etc. Auctore
 D. Guil. Dan. Jos. Koch. Edit. 1.
- Ledeb. Flora Rossica sive Enumeratio plantarum in totius Imperii Rossici etc. hucusque observatarum, auctore Dr. Car. Fr. a Ledebour.
- Pall It = P. S. Pallas Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs.
- Weinm. Enum. = Observationes quaedam Botanicae ad floram Rossicam spectantes. Scripsit J. A. Weinmann, im Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1837, No. VII.
- Mari. = Prodromus Florae Mosquensis. Auctore H. de Martius.

 Edit altera.
- Hoefft = Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans le district de Dmitrieff sur la Svapa, dans le gouvernement de Koursk, Par F. M. S. V. Hoefft



